

ما يمكن توقعه بعد الحصول على لقاح كوفيد-19

يمكن الحصول على النسخة من خلال: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html>

سيساعدك لقاح كوفيد-19 على حمايتك من الإصابة بعدوى كوفيد-19. قد تعاني من بعض الآثار الجانبية، والتي تعد علامات طبيعية على أن جسمك يبني الحماية ضد الفيروس. قد تؤثر هذه الآثار الجانبية على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية، ولكن يجب أن تزول في غضون أيام قليلة. لن يعاني بعض الأشخاص من أي آثار جانبية.



اسأل مقدم خدمة اللقاح عن بدء استخدام خدمة v-safe

استخدم هاتفك الذكي لإخبار مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأي آثار جانبية تظهر عليك بعد تلقي لقاح كوفيد-19. سنتلقى أيضاً رسائل تذكيرية إذا كنت بحاجة إلى تلقي جرعة ثانية

تعرف على المزيد حول v-safe
www.cdc.gov/vsafe

- قد تؤثر الآثار الجانبية على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية، ولكن يجب أن تزول في غضون أيام قليلة.
- بعض لقاحات كوفيد-19 تتطلب أخذ جرعتين من أجل الحصول على أكبر قدر من الحماية. يجب أن تحصل على الجرعة الثانية حتى لو كان لديك آثار جانبية بعد الجرعة الأولى، ما لم يخبرك مقدم خدمة اللقاح أو طبيبك بعدم الحصول عليها.
- ستحتاج فقط إلى جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 الناقل الفيروسي، لقاح كوفيد-19 Janssen من شركة Johnson & Johnson.
- يستغرق جسمك وقتاً لبناء الحماية بعد تلقي أي لقاح. قد لا تحميك لقاحات كوفيد-19 التي تتطلب جرعتين إلا بعد أسبوعين تقريباً من الجرعة الثانية. بالنسبة للقاحات كوفيد-19 التي تتطلب جرعة واحدة، يستغرق الأمر حوالي أسبوعين بعد تلقي اللقاح لكي يقوم جسمك ببناء الحماية.
- بعد أن تتلقى اللقاح بالكامل، قد تتمكن من البدء في القيام ببعض الأشياء التي توقفت عن فعلها بسبب الجائحة. تفضل زيارة موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للحصول على أحدث التوصيات. www.cdc.gov/coronavirus/vaccines.

لمقدم الرعاية الصحية، يرجى ملء المعلومات أدناه:

إذا كانت درجة الحرارة _____ ° فهرنهايت أو _____ ° مئوية أو أعلى؛ أو إذا كانت لديك أسئلة، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية.

أخبر مقدم الرعاية الصحية المتابع لك بشأن: _____

رقم هاتف مقدم الرعاية الصحية:

الدواء (إذا لزم الأمر): _____

تناول _____ كل _____ ساعة/ساعات حسب الحاجة.

(النوع والجرعة أو الكمية)

